



Comment ce médicament agit-il ?

L'atazanavir et le ritonavir sont des antirétroviraux (médicaments anti-VIH). Ils agissent en empêchant la multiplication du VIH (VIH = virus de l'immunodéficience humaine).

L'atazanavir et le ritonavir sont utilisés avec d'autres médicaments anti-VIH afin de ralentir la progression de la maladie. Ils aident à garder un système de défense efficace et diminuent le risque de développer des infections qui apparaissent lorsque le système de défense est faible (infections opportunistes).

L'atazanavir et le ritonavir ne guérissent pas le sida et n'éliminent pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser le condom, ne pas partager les seringues).



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et continuez votre traitement selon l'horaire prévu.



Mais, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu. **Ne doublez pas la dose.**

Mélange de médicaments !

L'atazanavir et le ritonavir peuvent interagir avec plusieurs autres médicaments. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif. Particulièrement les médicaments qui affectent l'acidité de l'estomac tels que : Maalox^{MD}, Diovol^{MD}, Pepcid AC^{MD}, Zantac 75^{MD}, etc. Ces médicaments peuvent diminuer l'efficacité de l'atazanavir. Ne prenez pas de millepertuis (St. John's wort) avec l'atazanavir. Si vous prenez aussi du Viagra^{MD}, Cialis^{MD} ou Levitra^{MD}, la dose de ces médicaments devra être diminuée.

www.guidetherapeutiquevih.com

Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec l'atazanavir et le ritonavir ?

Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur de l'hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou de la drogue.

Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets de l'atazanavir et du ritonavir chez la femme enceinte. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre l'atazanavir et le ritonavir et que vous êtes enceinte ou désirez l'être. L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.



Comment prendre ce médicament ?

ATAZANAVIR

1 capsule à 300 mg

RITONAVIR

1 capsule à 100 mg 1 fois par jour




Prendre l'atazanavir et le ritonavir ensemble à la même heure chaque jour, environ aux 24 heures, avec de la nourriture (repas léger ou collation). Ne pas ouvrir les capsules, elles doivent être avalées en entier.

Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose. Sinon, le virus peut développer une **résistance**. Le médicament perdra son effet sur le virus et le traitement ne sera plus efficace.

À moins d'effets indésirables graves (voir section **effets indésirables**), **n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.**



Quels sont les effets indésirables ?

| | | |
|---|--|--|
|  | Effet normal qui disparaîtra ou peut être traité Continuez le médicament | - Diarrhée, flatulences (gaz), nausées, vomissements, douleurs abdominales - Diminution de l'appétit |
|  | Contactez votre médecin Continuez le médicament | - <u>Rash</u> (rougeurs sur la peau) seul - Jaunissement de la peau et du blanc de l'oeil |
|  | Voyez IMMÉDIATEMENT votre médecin. | Rash AVEC : - Fièvre, ulcères (lésions) dans la bouche - Enflure, cloques (bulles sur la peau) - Rougeur des yeux - Nausées, vomissements, diarrhée - Douleurs aux muscles et articulations - Grande fatigue, malaises généraux Effet sur le rythme cardiaque : - étourdissements, palpitations ou battements cardiaques irréguliers. |

Avisiez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommodent. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Où et comment garder l'atazanavir et le ritonavir ?

Pas dans la salle de bain.

Conservez l'atazanavir et le ritonavir dans un endroit sec et à la température de la pièce. Ne pas garder le ritonavir plus de 30 jours à la température de la pièce.

Garder hors de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

