



Comment ce médicament agit-il ?

La névirapine est un médicament antirétroviral (anti-VIH). Elle agit en empêchant la multiplication du VIH (VIH = virus de l'immunodéficience humaine).

La névirapine est utilisée avec d'autres antirétroviraux afin de ralentir la progression de la maladie. Elle aide à garder un système de défense efficace et diminue le risque de développer des infections qui apparaissent lorsque le système de défense est faible (infections opportunistes).

La névirapine ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser le condom, ne pas partager les seringues).



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et continuez votre traitement selon l'horaire prévu.

Mais, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.



Mélange de médicaments !

La névirapine peut diminuer l'efficacité de certains médicaments.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif.



www.guidetherapeutiquevih.com

Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec la névirapine ?

Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur de l'hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou de la drogue.

Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets de la névirapine chez la femme enceinte. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre la névirapine et que vous êtes enceinte ou désirez l'être. L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.



Comment prendre ce médicament ?

NÉVIRAPINE

Du _____ au _____
1 comprimé à 200 mg, 1 fois par jour

Ensuite
____ comprimé(s) à 200 mg, ____ fois par jour

Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose. Sinon, le virus peut développer une **résistance**. Le médicament perdra son effet sur le virus et le traitement ne sera plus efficace.

À moins d'effets indésirables graves (voir section **effets indésirables**), *n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.*



Quels sont les effets indésirables ?

	Contactez votre médecin Continuez le médicament	<ul style="list-style-type: none"> - Rash (rougeurs sur la peau) seul - Si le rash survient dans les 14 premiers jours de traitement il faut attendre que les rougeurs disparaissent avant d'augmenter la dose de névirapine à 2 fois par jour.
	Voyez IMMÉDIATEMENT votre médecin.	Rash AVEC : <ul style="list-style-type: none"> - Fièvre, ulcères (lésions) dans la bouche - Enflures, cloques (bulles sur la peau) - Rougeur des yeux - Nausées, vomissements, diarrhée - Douleurs aux muscles et articulations - Grande fatigue, maux généraux <ul style="list-style-type: none"> - Hépatite : faiblesse inhabituelle, nausées, vomissements, perte d'appétit, urines foncées, selles pâles

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommoder. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Où et comment garder la névirapine ?

Pas dans la salle de bain.

Conservez la névirapine dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Garder hors de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

Suivi médical

Par des prises de sang régulière votre médecin surveillera les effets de la névirapine sur votre foie.

